

# EchinaGrip®

*Echinacea Purpúrea Extracto Seco 100 mg*

*Echinacea Purpúrea Tintura Madre 100 mg/ml*

## INFORMACIÓN PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD

### Venta Libre

**EchinaGrip®** consiste en un extracto conteniendo raíces y rizomas de Echinacea Purpúrea. El ingrediente activo es Echinacea Purpúrea.

**EchinaGrip® Comprimidos:** El ingrediente activo es Echinacea Purpúrea extracto seco 100 mg y los excipientes son Talco 16,98 mg, PVP 15,00 mg, Lactosa 165,02 mg, Estearato de Magnesio 3,00 mg. Se utiliza raíces y rizomas. Contiene como mínimo 0,8 mg de ac. clorogénico por comprimido.

**EchinaGrip® Tintura Madre:** El ingrediente activo es Echinacea Purpúrea 100 mg/ml. Se utiliza raíces y rizomas. Contiene como mínimo 0,1 % de ac. clorogénico.

**Indicación de uso:** Alivio sintomático y prevención de infecciones recurrentes de las vías aéreas altas. Apoyo al tratamiento del resfriado común.

**Posología/ Modo de empleo:** Vía de administración oral. Dosis:

**EchinaGrip® Comprimidos:** La dosis recomendada es para: **Adultos y adolescentes mayores de 12 años:** Tomar 2 comprimidos en el desayuno, 2 comprimidos en el almuerzo y 2 comprimidos en la cena con un vaso de agua. Si después de 10 días de tratamiento los síntomas persisten, consulte a su médico o a un profesional sanitario.

**EchinaGrip® Tintura Madre:** La dosis recomendada es para: **Adultos y adolescentes mayores de 12 años:** Tomar 40 gotas en un vaso de agua o jugo de frutas con el desayuno, almuerzo y cena. Este medicamento se utiliza por vía oral. Si después de 10 días de tratamiento los síntomas persisten, consulte a su médico o a un profesional sanitario.

**Modo de administración:** Puede ser administrado solo o junto con comida.

**Cuidados de conservación y uso:** Conservar el producto a temperatura ambiente, menor a 30 °C en su envase original. **No use el medicamento con el plazo de validez vencido.**

**Precauciones y Advertencias:** SI UD. ESTA TOMANDO ALGÚN MEDICAMENTO, CONSULTE CON SU MÉDICO ANTES DE INGERIR ESTE PRODUCTO. NO USE ECHINAGRIP® si usted está embarazada o en etapa de lactancia.

**Posibles efectos no deseados:** En raras ocasiones pueden aparecer reacciones alérgicas cutáneas. Se desconoce la frecuencia.

**Contraindicaciones:** EchinaGrip® está contraindicada en casos de enfermedades sistémicas progresivas como la tuberculosis, enfermedades del sistema inmunitario, colagenosis, esclerosis múltiple, SIDA, infecciones por VIH y otras enfermedades inmunitarias. No consuma este medicamento sin el conocimiento de su médico ya que puede ser perjudicial para su salud. Si Ud está embarazada o dando de mamar consulte con su médico antes de ingerir este medicamento.

**Interacciones medicamentosas:** NO SE CONOCEN.

**Sobredosificación:** Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247. Hospital Alejandro Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777.

**Propiedades farmacológicas:** Su actividad se explica por una estimulación del sistema inmunitario, contribuyendo a combatir las infecciones y estimulando las respuestas inmunes. El estudio publicado, Immunological studies of Revitonil, a phytopharmaceutical containing Echinacea purpurea and Glycyrrhiza glabra root extract (Wagner, Phytomedicine. 2002 Jul;9(5):390-7), ha podido demostrar esta actividad sobre el sistema inmunitario, mediante test de laboratorio, identificando también diversos constituyentes que provocan este efecto, además de la echinacina y los polisacáridos. Bauer estudió que los principios activos (isobutilamida, poliinos, echinacósido y los derivados del ácido cichoreico), contenidos en los extractos alcohólicos de la raíz de la Echinacea, tenían una acción inmunoestimulante, aunque menos importante que la de los polisacáridos.

### Propiedades farmacológicas a nivel general:

- Inmunomoduladora e inmunoestimulante por aumento de las defensas inespecíficas (polisacáridos, glicoproteínas, alquilamidas y ácido acicóricico). En ensayos in vitro sobre granulocitos humanos se ha comprobado que produce:
- Aumento de la actividad fagocitaria de los macrófagos en un 23%. Los macrófagos son células del sistema de defensa que rápidamente emigran al sitio de la infección para detener a las bacterias.
- Aumento en la producción de interleucinas 1, 6 y 10 (IL-1, IL-6 y IL-10).
- Aumento en la producción del factor de necrosis tumoral alfa (TNF $\alpha$ ) mediador polipeptídico proinflamatorio con actividad antitumoral.
- Estimulación de la proliferación de los linfocitos T y "natural-killer" (NK).
- Inhibición de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos.
- Activa el sistema del complemento.
- Inhibición de las enzimas hialuronidasas tisulares y bacterianas, impidiendo la difusión de los microorganismos.
- Antiviral (polisacáridos, equinacósido y otros ésteres caféicos).
- Antibacteriana (polisacáridos, equinacósido y otros ésteres caféicos).

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Este medicamento es Libre de Gluten.**



Medicamento Herbario autorizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social.

Medicamento autorizado por Certificado N°: 59032.

Laboratorio MADAUS S.A.

Director Técnico: Farm. Gustavo Ángel Frutos.

Acondicionado primario de comprimidos: Cnel. Martiniano Chilavert 1124/26, CABA.

**Forma de conservación:** Conservar en su envase original a temperatura ambiente menor a 30 °C.

**Presentaciones:** EchinaGrip® Comprimidos: Envases conteniendo blíster por 30 comprimidos. EchinaGrip® Tintura Madre: Frasco con inserto por 60 ml.

Fecha de última revisión del prospecto aprobado por ANMAT: 15/08/2019.

**DR. MADAUS**  
laboratorios

Innovación en Productos Naturales